



Aldersbestemmelse av skutt elg

Dette skjema kan ikke brukes for andre hjortedyr.




Kalv, ca. ½ år

Elgen har første høsten som kalv bare 4 kinntenner i hver kjeve halvdel (1, 2, 3, 4). De 3 første tennene er melketenner, og tann nr. 3 er på dette alderstrinn tredelt (a, b, c).




1 1/2 år (seint utviklet)

Når elgen er 1 ½ år har den om høsten oftest 6 kinntenner i hver kjevehalvdel, men det forekommer særlig i september at tann nr. 6 ennå ikke er kommet opp av tannkjøttet. Da vil heller ikke de blivende tenner 1, 2 og 3 ha brutt gjennom tannkjøttet, og de gamle, slitte melketennene sitter igjen på toppen av de blivende tennene. Hvis dette er tilfelle, er tann nr. 3 fortsatt tredelt (a, b, c).



1 ½ år (tidlig utviklet)

Under gode betingelser og særlig i oktober, er det normalt at 1 ½-åringen har 6 synlige kinntenner og at de 3 forreste er nye og hvite. Tann nr. 3 vil da være todelt (a,b).



2 ½ år og eldre

Når elgen er 2 ½ år og eldre blir aldersbestemmelsen mer skjønnsmessig etter denne metode. Hos en 2 ½ åring er de 3 første kinntenner ubetydelig slitt,* men det avhenger noe av næringsforholdene. Alle dyr kan imidlertid aldersbestemmes nøyaktig ved snitting av tannrota, og en får fram årringer som hos et tre.